

Prewencja zrostów po operacjach ginekologicznych



Skrócona informacja o produkcie:

Hyalobarrier gel® jest sterylnym, przezroczystym żelem o bardzo wysokiej lepkości uzyskanym przez kondensację kwasu hialuronowego, który jest jednym z głównych składników ludzkiej tkanki łącznej oraz nabłonkowej i śródbłonkowej. Jest w 100 % czystym kwasem hialuronowym bez dodawania jakichkolwiek innych substancji. Dzięki swojej wysokiej lepkości Hyalobarrier Gel idealnie przylega do powierzchni tkanek i ścian jamy brzusznej tworząc barierę oddzielającą tkanki podczas fazy regeneracji po zabiegu chirurgicznym. Jest wskazany do zapobiegania tworzeniu się zrostów pooperacyjnych lub do zmniejszania ich liczby i ciężkości po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej i miednicy (np. usuwanie mięśniaków, operacje jajników, jajowodów, endometrioza, uwalnianie zrostów wewnątrzmacicznych...)

Żel jest całkowicie wchłaniany i degradowany naturalną drogą w ciągu 4 tygodni po zastosowaniu.

Produkt jest dostępny w dwóch formach:

Hyalobarrier gel®: do operacji z otwarciem powłok brzusznych (laparatomia)

Hyalobarrier gel® endo: do zabiegów endoskopowych (laparoscopia, histeroscopia).

Uwaga: Przechowywać w temp. 2-8 stopni Celsjusza. Nie zamrażać!

Wytwórca: Fidia Advanced Biopolymers S.r.l., Via Ponte della Fabricia 3/B - 35031 Albano Terme (PD) Italie

NORDIC
PHARMA

NORDIC Pharma
www.nordicpharma.pl

Czeka Cię operacja ginekologiczna?



Hyalobarrier® gel
prewencja powstawania zrostów pooperacyjnych

Zapytaj swojego lekarza

www.zrosty.pl


www.zrosty.pl

Czy wiesz, że ...

Zrosty są najczęstszym powikłaniem po operacjach w obrębie jamy brzusznej i miednicy?

Czy wiesz, że ...

Zrosty są nieprawidłowymi (patologicznymi) połączeniami między tkankami i narządami.



Zrosty

Czy wiesz, że ...

Zrosty powstają po operacjach i po przebytych stanach zapalnych (zapalenie jajników, endometrioza...)

Po jakich operacjach najczęściej powstają zrosty?

- ▶ usuwanie mięśniaków macicy
- ▶ operacje endometriozy
- ▶ operacje na jajnikach (cysty), jajowodach
- ▶ uwalnianie wcześniej powstałych zrostów
- ▶ cięcia cesarskie
- ▶ łyżeczkowanie macicy
- ▶ operacje chirurgiczne (zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego)...


Zrosty mogą powodować:

- ▶ niepłodność
- ▶ przewlekłe bóle brzucha
- ▶ wzdęcia, zaparcia, dolegliwości bólowe związane ze zwężeniem jelita
- ▶ niedrożność jelit
- ▶ bolesne miesiączki
- ▶ ból w trakcie stosunku płciowego
- ▶ konieczność kolejnych operacji


Czy zrostom można zapobiec? **TAK**

- ▶ Są tak zwane bariery przeciwzrostowe – produkty zapobiegające powstawaniu zrostów, jak np. Hyalobarrier Gel, który aplikuje się w trakcie operacji i który w sposób mechaniczny chroni i zapobiega powstawaniu zrostów.

Zapytaj swojego lekarza.



Uwolnienie zrostów



Aplikacja żelu Hyalobarrier



Gojenie tkanek w miejscu aplikacji żelu (brak zrostów)